



DETERMINANTES SOCIALES ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH EN PACIENTES INGRESADOS DE 2015-2017 EN CAPASITS DE PUEBLA.

GUILLÉN MUÑOZ, CLAUDIA NAYELI 1. ESPINOSA TESIS, ANA MARÍA 2 . PAPAQUI LIMÓN, ELIZABETH 2 .

1 FACULTAD DE MEDICINA, BUAP. cnayeligm@gmail.com, 2 CAPASITS PUEBLA

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años el conocimiento y manejo del VIH ha mejorado, sin embargo, existen factores en la población que impiden la disminución de casos. El aumento de mujeres portadoras de VIH que desconocen su padecimiento incrementó el número de casos de transmisión perinatal. Además, existen deficiencias en los estándares para disminuir la transmisión, en la resolución del embarazo, la eliminación de la lactancia materna, el uso de medicamentos antirretrovirales durante el embarazo y la profilaxis del recién nacido [1,2,3,4]

OBJETIVO

Describir los determinantes sociales asociados a la transmisión vertical.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo. Se utilizó la base de datos de los pacientes ingresados del 2015-2017 y posteriormente revisión del expediente clínico. Se analizaron los datos con el software SPSS y se utilizaron medidas de frecuencia.

RESULTADOS

Se estudiaron 42 pacientes, de los cuales 26 fueron casos de transmisión vertical, 50% femeninos, 50% masculinos. Las variables utilizadas fueron factores relacionados a la madre y a los antecedentes perinatales del recién nacido. Del total de casos 38% de los casos fueron partos; 61% de los pacientes recibieron lactancia materna, 19 % de los



pacientes fallecieron antes de llegar a los 2 años de edad. Del total de las madres el 0% tuvo TARV durante el embarazo, 6 de ellas con escolaridad primaria, 5 secundaria, 7 bachillerato, 1 analfabeta, y solamente 1 con licenciatura, del resto se desconoce. Más del 65 % de las madres únicamente se dedicaban a labores del hogar, y ninguna tuvo adecuado control del VIH, antes y durante el embarazo.

CONCLUSIÓN

Está evidenciado que la seroconversión de los pacientes pediátricos está relacionada con el tratamiento antirretroviral de la madre. El resultado del estudio muestra que hay ejes de desigualdad; el nivel educativo, la ocupación, recibir tratamiento antirretroviral de manera oportuna que aumentan la probabilidad de transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humana.

Palabras Clave: VIH, transmisión vertical, determinantes sociales.

REFERENCIAS

- [1] CENSIDA. Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH [Internet] 1st ed. CENSIDA, editor. México: Secretaría de Salud, CONASIDA; 2018 [cited 2018 Sep 16] 1-199 p. Available from: www.salud.gob.mx/conasida
- [2] Olivares Flores Beatriz, Laguna Lezama Karina FDKLCMF. Causales críticas asociadas a la transmisión vertical del VIH y Sífilis congénita [Internet] México ; 2016 [cited 2018 Sep 15] Available from: <http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/CausalesTVVIHySC.pdf>
- [3] López P, García AS. Transmisión materno-fetal [Internet] [cited 2018 Sep 15] Available from: https://scp.com.co/precop-old/pdf/1_3.pdf
- [4] Díaz-Vega A, González-Santes M, Domínguez-Alfonso A, Arias-Contreras Al. www.medigraphic.org.mx Factores de riesgo asociados a la transmisión madre-hijo del VIH en los pacientes del CAPACITS de Veracruz PERINATOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN HUMANA ARTÍCULO ORIGINAL [Internet] Vol. 4. [cited 2018 Oct 3] Available from: www.medigraphic.org.mx