



TRATAMIENTO DE LA SONRISA GINGIVAL MEDIANTE EL RECONTORNEO ESTÉTICO Y REPOSICIONADO LABIAL

SALAMANCA TAPIA A.¹

1 POSGRADO DE PERIODONCIA, UPAEP

net488@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Una sonrisa estética es de gran importancia para hombres y mujeres, es la imagen y la presentación hacia la sociedad, independientemente de su profesión o actividad diaria. La sonrisa gingival es la exposición excesiva de la encía mayor a 3 mm al sonreír. Las principales causas del exceso gingival son; crecimiento excesivo del maxilar, agrandamiento gingival por biofilm dental o fármacos, erupción pasiva alterada, hiperactividad labial y labio corto. Procedimientos como; cirugía ortognática, botox y el recontorneo estético en conjunto con el reposicionado labial, ayudan a corregir la sonrisa gingival excesiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El exceso gingival causa una apariencia poco agradable al sonreír, provocando una baja autoestima. Por lo tanto, es necesario dar a conocer los procedimientos estéticos más estables como el recontorneo estético y reposicionado labial para la corrección de la sonrisa gingival.

Reporte de caso. Paciente femenino de 25 años ASA I, acude a la clínica de periodoncia, presentando incomodidad al sonreír. En el análisis bucofacial, presenta un rostro asimétrico con hipermovilidad labial, intraoralmente se observa exceso gingival mayor a 5mm, con coronas clínicas cuadradas y cortas. Después de la fase I, se ejecuta procedimiento quirúrgico infiltrando lidocaína al 2% con epinefrina 1: 100,000. Se mide la encía queratinizada con sondeo óseo, identificado la unión cemento esmalte. Se refleja colgajo, con osteotomía se modela una arquitectura positiva de 4mm, se posiciona el colgajo y se colocan puntos simples. Realizando incisión a espesor parcial en la mucosa bucal del primer molar derecho al primer molar izquierdo sobre la línea mucogingival, uniéndose



con la mucosa labial con una medida de 10 a 12 mm formando un rombo, eliminando por completo el epitelio. La mucosa labial se afronta con la línea mucogingival y se colocan puntos simples con nylon 5-0.

Se realizan revisiones periódicas, a los 21 días se retira la sutura, presentando disminución de la inflamación, sin infección. A los 31 días no se observan signos de inflamación, al sonreír se observa la corrección de la sonrisa gingival.

ASPECTOS BIOÉTICOS

El caso siguió lineamientos del Código de Núremberg, Declaración de Helsinki, previo a la cirugía se entregó consentimiento informado.

CONCLUSIÓN

El recontorneo estético y el reposicionado labial son excelentes alternativas para el tratamiento de la sonrisa gingival, siempre que se realice un buen diagnóstico periodontal y facial. Son procedimientos atraumáticos sin complicaciones postquirúrgicos y cicatrización rápida, que ayuda a recuperar la confianza del paciente al sonreír.

Palabras clave: recontorneo, reposición, sonrisa, gingival

REFERENCIA

1. Gabrić PD, Blašković M, Brozović J, Sušić M. Surgical treatment of excessive gingival display using lip repositioning technique and laser gingivectomy as an alternative to orthognathic surgery. *J Oral Maxillofac Surg.* 2014; 72 (2): 404.e1-11.
2. Ragghianti Zangrando MS, Veronesi GF, Cardoso M V., Michel RC, Damante CA, Sant'Ana ACP, et al. Altered Active and Passive Eruption: A Modified Classification. *Clin Adv Periodontics* 2017;7(1):51–6.
3. Wilckens M, Beltrán V, Leiva C, Donaire F. Manejo quirúrgico periodontal de la erupción pasiva alterada: reporte de casos. *Rev Clínica Periodoncia, Implantol y Rehabil Oral* 2015;8(2):167–72.