



## MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PARACLÍNICAS EN SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA MUJER PUEBLA

ALDACO RODRIGUEZ, ALFONSO RAFAEL<sup>1</sup>; FUENTES CALVO, KEVIN JOSEPH<sup>1</sup>;

RIVERA VEGA, DIANA CHRYSSELL<sup>1</sup>; VÁZQUEZ GUADALUPE, JOSEPH<sup>1</sup>

ASESOR: LÓPEZ FARFÁN, JOSÉ ÁNGEL<sup>1</sup>

<sup>1</sup> FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP). [alfonsorafael.aldaco@upaep.edu.com](mailto:alfonsorafael.aldaco@upaep.edu.com)

### INTRODUCCIÓN

El Síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un desorden heterogéneo, metabólico y endocrino donde también es denominado como hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica que es una patología de gran importancia en nuestro país por una estrecha relación a enfermedades metabólicas (1). Por otra parte, factores ambientales como la alimentación, nutrición y actividad física influyen en esta entidad (2). El SOP, es uno de los principales promotores de hiperandrogenismo, además, ocurre en el 4% de las mujeres en edades fértiles, sin embargo, se reportan una prevalencia de hasta 10% en poblaciones de alto riesgo, lo que la convierte en la forma más común de infertilidad anovulatoria (3). Con respecto a la sintomatología, en las mujeres con SOP, se presentan en los primeros años después de la pubertad, irregularidades menstruales, infertilidad, manifestaciones de hiperandrogenismo u otras disfunciones endocrinas (4).

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se realiza el siguiente estudio para conocer las manifestaciones clínicas del SOP en un grupo social determinado (Mujeres derechohabientes del Hospital de la Mujer, de Puebla), ya que es una patología de gran importancia en nuestro país ya que representa una de las endocrinopatías más frecuentes en la mujer y es la principal causa de hiperandrogenismo (5).

Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y paraclínicas en el síndrome de ovario poliquístico en pacientes del Hospital de la Mujer, Puebla?



## OBJETIVO GENERAL

Determinar cuáles son las manifestaciones clínicas y paraclínicas en el síndrome de ovario poliquístico en pacientes del Hospital de la Mujer Puebla.

Hipótesis. Por ser un estudio observacional no se requiere hipótesis.

## MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio es descriptivo de prevalencia, retrospectivo, retrolectivo, unicéntrico, homodemico y observacional, en pacientes con SOP de edad entre los 15 a 30 años en el Hospital de la Mujer Puebla. En este se analizarán expedientes clínicos comprendiendo de 3 meses antes a la fecha del día 3 de marzo del 2020, observando las manifestaciones clínicas y paraclínicas de las pacientes con SOP.

**Aspectos bioéticos.** Respecto a las consideraciones éticas, se solicitará a las autoridades del Hospital de la Mujer Puebla con los documentos correspondientes y basándonos en los principios éticos.

**Alcances y limitaciones.** Importancia y es un proyecto en desarrollo, además de ello está en proceso el análisis de los datos y obtención de los resultados.

## CONCLUSIONES

Proyecto de investigación en desarrollo.

**Palabras clave:** SOP, clínica, paraclínico

## REFERENCIAS

- [1] Moran C, Arriaga M, Rodriguez G, Mor S. Obesity in Polycystic Ovary Syndrome. Polycystic Ovary Syndrome. 2012;.
- [2] Muñoz C en "Mesa de actualización: Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)" PloS ONE 2016; 4(2).



- [3] Sánchez Gaitán E. Actualización del manejo de síndrome de ovario poliquístico. Revista Médica Sinergia. 2019;4(12) Ce322.
- [4] Chilingua Villacis Sixto, Aguirre Fernández Roberto, Agudo Gonzabay Maritza, Chú Lee Ángel, Cuenca Buele Sylvana. Criterios diagnósticos y tratamiento integral terapéutico del síndrome de ovarios poliquísticos. Rev Cubana Obstet Ginecol. 2017; 43( 3 ): 173-181.
- [5] Winnykamien I, Dalibon A, Knoblovits. P. "Síndrome de ovario poliquístico". Rev. Hosp. Ital. B, Aires, 2017; 31